






PLANCHE 01 :



*Russula laurocerasi* Melzer : groupe de *foetens*. Odeur d'amandes amères, saveur âcre. Habitat sous hêtres, chênes et charmes. Sporée crème pâle 2A-B. Spores 7-8,5 x 7-7,5 µm , zébrées-ailées avec de petites verrues. Cuticule avec de rares dermatocystides.



*Russula betularum* Hora : Emeticinae de couleur rouge ou rose souvent avec des plages décolorées. Elle est de consistance fragile. Saveur nettement âcre. Odeur d'*emetica*. Habitat sous bouleaux. Réaction faible et lente à la teinture de gaïac. Sporée blanche 1A. Spores, 8,5-11 x 7-8,5 µm, obovales, verruqueuses et subréticulées à réticulées.



*Russula tinctipes* Blum ex. Bon : sosie de *Russula pseudointegra* Arnould et Goris ex Bon. Sur le terrain, elle se distingue par sa vive réaction au gaïac, sa saveur douce. Habitat sous hêtres. Sporée jaune 4B comme *pseudointegra*. Spores 7,5-11 x 6,5-10 µm, subglobeuses, ornées de petites verrues parfois cristallines, ornementation assez basse. Cuticule avec dermatocystides sans incrustations après traitement à la fuchsine.