




PLANCHE 03 :



*Russula brunneoviolacea* Crawshay : chapeau violet ou vineux, parfois tacheté de brun, souvent dévoré par les larves. Cuticule souvent marquée de petites « taches de rousseur ». Chair douce et jaunissante dans les blessures. Habitat : bois de feuillus. Sporée 2B. Spores obovales 7-9,2 x 6,2-7,5 µm, avec épines souvent très longues et recourbées jusqu'à 2,25 µm. Verrues parfois reliées par quelques fins connectifs.



*Russula cavipes* Britzelmayr : chapeau de couleur vert-lilacin-violet. Jaunissement des lames et du stipe. Stipe carverneux. Odeur safranée et de pomme. Réaction rose-rouge à l'amoniaque. Habitat sous conifères (*Picea*) dans les endroits humides, généralement de montagne. Cuticule avec dermatocystides volumineuses. Sporée 2a-b. Spores obovales 9-10 x 7-8µm, épineuses (jusqu'à 1,10 µm de haut, subréticulées (fins connectifs)).



*Russula cuprea* Krombholz : chapeau de coloration très variable pouvant être jaune olive, avec des tons vineux, orangés, rouges ; léger jaunissement de la chair et du stipe ; stipe creux et fragile ; saveur âcre, brûlante ; habitat sous feuillus ( hêtres et charmes). Cuticule avec dermatocystides et poils diverticulés. Sporée jaune vif : 4d-e. Spores 8,5-10 x 6,7-8,2)µm, obovales, échinulées-spinuleuses ; épines isolées sans crêtes et connectifs.