







PLANCHE 04 :



*Russula curtipes* Moller-J. Schaeffer : chapeau vineux à centre décoloré (assez stable dans ses couleurs) ; espèce de taille moyenne mais pouvant atteindre jusqu'à 12 cm ; stipe pas toujours court (souvent très court sur les gros exemplaires) ; sporée plus claire que *R. romellii*, 3c à 4a ; habitat sous hêtres. Cuticule avec de rares dermatocystides. Spores obovales échinulées-spinuleuses 7-9,5 x 6-7,5µm. Hauteur de l'ornementation pouvant atteindre parfois 0,9 µm. Spores zébrées mais non réticulées, crêtes assez grosses.



*Russula integra* Fries : chapeau brillant, de couleur très variable, du jaune au brun en passant par le rougeâtre. Lames jaunes avec l'arête un peu plus claire. Odeur faible, et saveur typique de noisette. Habitat en pessières d'altitude sur calcaire. Sporée généralement 4c. Spores obovales 8-11 x 7-9,5µm, à fortes épines isolées (parfois caténulées). Cuticule avec dermatocystides et poils incrustés. Poils effilés.



*Russula laeta* J. Schaeff. : couleur du chapeau assez variable du rouge foncé à l'orangé (vers *R. velenoskyi*) et parfois même décoloré en paille jaunâtre. Odeur fruitée. Saveur légèrement astringente (un peu vers *R. lepida*). Elle n'est pas toujours facile à déterminer sur le terrain. Sporée jaune 4C. Spores obovales 7-9 x 6,5-7,3 µm, spinuleuses, piquetées. Les épines sont souvent jumelées. Cuticule avec dermatocystides réagissant faiblement en SBA et hyphes primordiales avec incrustations parfois douteuses (difficiles à observer).