




PLANCHE 08 :



*Russula rubra* Fries : chapeau rouge (comme *R. lepida*) mais particulièrement mat (reflet crayeux) par temps sec. Odeur de miel. Saveur très âcre. Sporée 3b. Spores obovales (7-9 x 6,2-8  $\mu\text{m}$ ), à ornementation assez basse, non réticulées mais plutôt zébrées-cristallées. Cuticule incrustée.



*Russula sanguinea* Fries : chapeau rouge rose ou rouge sang. Lames anastomosées et subdécurrentes. Stipe teinté de rose. Saveur âcre. Habitat sous pins. Sporée 3a. Spores obovales (7-10 x 8-8,5  $\mu\text{m}$ ) à épines subsolées (jusqu'à 0,7-0,8  $\mu\text{m}$ ) avec quelques rares courts connexifs ; ornementation assez basse.



*Russula solaris* Ferdinandsen et Winge : chapeau jaune vif, parfois avec le milieu orangé ou rouge (comme un œuf sur le plat). Chair fragile et odeur bien particulière de vinaigre, de moutarde, de *R. pseudointegra*. Sporée 2c. Spores obovales-elliptiques (7-9 x 5,5-7,5  $\mu\text{m}$ ) avec verrues isolées (de très rares petits connexifs) jusqu'à un  $\mu$  de haut.