

### Famille des Ustilaginacées

Spores durables simples, isolées ou groupées en glomérule, germant en produisant une baside cylindrique, pourvue de cloisons transversales. Sporidies ou basidiospores insérées latéralement à la baside

1.	spores simples, isolées (non réunies en glomérule)	2.
	spores groupées par 2. Sore inclus dans le fruit	7.
	spores semblables entre elles, réunies en glomérule de plus de 2 spores	8.
2.	sore dépourvu d'hyphes stériles	3.
	sore divisé par des hyphes stériles nombreuses	Farysia
3.	masse sporifère pulvérulente	4.
	masse sporifère compacte, granuleuse	6.
4.	sore dépourvu d'enveloppe hyphale	Ustilago
	sore inclus (tout au moins au stade jeune) dans une enveloppe hyphale	5.
5.	enveloppe hyphale stérile	Sphacelotheca
	enveloppe hyphale génératrice de spores fertiles	Crozalsiella
6.	sore inclus dans l'hôte	Melanopsichium
	sore superficiel, comprimé dans une enveloppe hyphale	Cintractia
7.	sore pulvérulent. Spores largement adhérentes	Schroeteria
	sore compact. Spores adhérentes par un isthme	Schizonella
8.	spores facilement séparables	Sorosporium
	spores fortement appliqués les unes aux autres pour former une balle sporifère	9.
9.	balle sporifère régulière	Thecaphora
	balle sporifère irrégulière	Tolyposporium