


NOM	<b>Puccinia circaeae</b> Pers. 1801	
Synonymes		
Hôte A	Inconnu (espèce autoxène ?)	
stade 0 ou S	spermogonies	
	spermaties	
stade I	écidies	
	écidiospores	
hôte B	<i>Circaea lutetiana</i> L. (Circée de paris)	
stade II	urédies (sores)	Pustuleux, fermes, +/- violacés
	urédospores	
stade III	téleutospores	biloculaires
Récoltes :	Sclaigneaux (B-5300), 25/09/2005 leg. Daniel DESCHUYTENEER	





Les sores pustuleux, fermes, de couleur roux +/- violacé, sont de 2 sortes :


- Ø petits, groupés, ou en séries orbiculaires, contenant des téleutospores qui germent aussitôt (*f. persistens*) et de forme +/- trapue, à paroi lisse brun clair et apex positionné latéralement à 26-39 x 11-14 µm
- Ø gros, pustuleux, donnant des téleutospores à paroi brun foncé, qui ne germent qu'après hivernage (*f. fragilipes*) à 25-44 x 9-14 µm



Téleutospores de la *f. fragilipes*, à apex décentré



Téleutospores observées dans le rouge Congo



Vu dans la même préparation : qu'est-ce que c'est ?

Toutes les photos ont été réalisées par Daniel DESCHUYTENEER